

VACCINATION COVID

1) Personnes de 75 ans. Personnes vulnérables à très haut risque avec prescription médicale (1)

(1) atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; transplantées d'organes solides ; transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d'organes ; atteintes de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d'infection (liste établie par les filières de santé des maladies rares) ; atteintes de trisomie 21.

VACCIN PFIZER-MODERNA

EN CENTRE DE VACCINATION

0 800 009 110 (service et appel gratuits)

DOCTOLIB - KELDOC - MAIIA

<https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html>

exemple : Centre de vaccination HYERES - Forum du casino

3 Avenue Ambroise Thomas, 83400 HYERES - 08 00 08 34 10

2) Personnes de 50 à 64 ans (inclus) atteintes de comorbidités (2)

VACCIN ASTRA ZENECA

A partir de début mars chez votre médecin généraliste.
Collobrières : prendre RDV par la plateforme téléphonique
du Dr Baptista : 04 94 48 07 58.

(2) Facteurs de risque de forme grave pour lesquels des études ont été publiées :

- pathologies cardio-vasculaires : **hypertension artérielle** (HTA) compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), **antécédent d'accident vasculaire cérébral**, antécédent de **coronaropathie**, antécédent de chirurgie

cardiaque, **insuffisance cardiaque** stade NYHA III ou IV ; - **diabète** non équilibré ou compliqué ; - **pathologies respiratoires** chroniques susceptibles de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ; - insuffisance rénale chronique dialysée ; - **obésité** avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 ; - **cancer évolutif** sous traitement (hors hormonothérapie) ; - Patients atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins - Personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise - Personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie. Affections neuromusculaires, pouvant altérer la fonction respiratoire : maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégié, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive. Les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse.